

神経痛、筋肉痛、関節痛、手足のしびれ

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

アリナロングZXコンドロ錠

第3類医薬品

— コンドロイチン硫酸、フルスルチアミン、ビタミンB6、B12、E配合 —

- 中高年の膝と腰の痛みの大半は、変形性関節症といわれ、骨と骨の間のクッションの役割を果たしている関節軟骨が衰え、すり減って起こる場合が多いのです。コンドロイチンは関節軟骨内に多く含まれ、弾力性や保水のはたらきがありますが、加齢とともに弱くなりますので、痛みをなくすために補給せねばなりません。
- 本剤は、コンドロイチン硫酸を主体に、神経や筋肉に強く作用するフルスルチアミン（ビタミンB1誘導体）を始め、ビタミンB6、B12、Eを効果的に配合していますので、ひざ、関節痛、腰痛、神経痛、五十肩などに、優れた効果があります。
- 緩衝剤として、塩酸グルコサミンを配合しています。

! 使用上の注意

相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などよりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 服用後、消化器に吐き気・嘔吐、口内炎の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 3. 服用後、軟便、下痢の症状があらわれるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合、又は1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 成分・分量 6錠(1日量)中

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	… 900mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	… 30mg
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体) (フルスルチアミンとして100mg)	… 109.16mg	シアノコバラミン(ビタミンB12)	… 60μg
添加物として、塩酸グルコサミン(緩衝剤)、セルロース、カルメロースカルシウム、乳糖水和物、無水ケイ酸、二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、黄色三二酸化鉄を含有します。			

● 用法・用量

15歳以上	1回 2錠	1日 3回 食後に服用してください。
7歳以上 15歳未満	1回 1錠	

注意 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

● 効能

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 腳氣
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください」
- 次の場合のビタミンB1の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

(保管及び取扱い上の注意)

- (1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。(4)外箱に表示した使用期限内に服用してください。

- 空気中の温氣などにより、変色など錠剤が変質することがありますので、次のことを守ってください。
○ 使用後は、必ず密栓してください。○ぬれた手で触れないでください。○開封後は吸湿のおそれがありますので、ビンの中の詰め物を捨ててください。(詰め物は輸送中、錠剤の破損を防ぐためのものです。)

糸田薬品工業株式会社

製造販売元 奈良県高市郡高取町市尾986

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

本品についてのお問合せ先：

お客様相談室 TEL 0744-52-3720

月～金曜日 10:00～16:00(祝祭日、特定日を除く)