

関節痛・腰痛・神経痛・手足のしびれ

服用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

オキソリピタンDXゴールド

第3類医薬品

○ 本剤の特性

- 理研オキソレヂン末(にんにく抽出無臭有効成分)は、ビタミンB₁の腸管からの吸収と体内への貯蔵を促進し、ビタミンB₁の効果を高めることにより、関節痛、筋肉痛、肉体疲労などの症状にすぐれた効きめをあらわします。
- コンドロイチン硫酸は関節軟骨や血管、角膜などに存在する成分で身体の弾力性保持やクッションの役割をし、関節痛や筋肉痛、目の疲れの症状にすぐれた効きめをあらわします。又、緩衝剤として塩酸グルコサミンを配合しています。
- ビタミン各種(B₁、B₂、B₆、B₁₂、E)の配合により神経痛、筋肉痛などのほか、血液循環を良くし、手足のしびれ、肩こりなどの症状にすぐれています。

! 使用上の注意



相談すること

- 次的人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、消化器に吐き気・嘔吐の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 次の場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)服用後、軟便、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合。(2)1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合。

成分・分量 (6カプセル中)

理研オキソレヂン末	1000mg	トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE)	51.79mg
(にんにく抽出成分)		チアミン硝化物(ビタミンB ₁)	30mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	450mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	50mg
シアノコバラミン倍散	60mg	リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg
(ビタミンB ₁₂ 60μg)		ガムマオリザノール	10mg
添加物として、塩酸グルコサミン(緩衝剤)、二酸化ケイ素、パレイショデンブン、ラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、炭酸カルシウムを含み、カプセル本体はヒプロメロース、酸化チタン、赤色102号を原料とする。			

効能

次の諸症状の緩和：筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ、眼精疲労、便秘
脚気 「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₁補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

15歳以上 1回 2カプセル 11歳以上 15歳未満 1回 1カプセル 1日3回食後に服用してください。
注意 小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させてください。

● 使用のカプセルは、牛、豚などの動物性ではなく、植物性のセルロースカプセルを使用しております。

右図のように、カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で押して取り出しますが、余り力が強すぎると、カプセルが割れる場合がありますので、ツメを立てず指先でやさしく押し出してください。(誤ってそのまま飲み込まないでください)



保管及び取扱い上の注意

- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- 外箱に表示した使用期限内に服用してください。
- 本剤は、開封後の保管の状況により、臭いがする場合がありますが、内容成分に変化はございませんのでご安心ください。
- PTPのアルミ箔が破れ、中身のカプセルが変質しないように、保管及び携帯にご注意ください。

発売元  日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

本品について お客様相談室 TEL 0744-52-3720
のお問い合わせ先 月～金曜日 10:00～16:00(土、日、祭日を除く)

製造販売元

米田薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町市尾986

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

14021