

# ハイティナCプレミアム

第3類医薬品

## 〔特徴〕

L-システインとアスコルビン酸(ビタミンC)が協力して、メラニンの生成をおさえ、肌細胞の代謝を促進させ、しみ、そばかすや日焼けによる色素沈着を緩和します。  
また、リポフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)、ニコチン酸アミド(ビタミンB<sub>3</sub>)、ピオチン(ビタミンH)の4つのビタミンが、からだの代謝を助け、肌の機能を正常に整えます。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるため、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ● 成分・分量 4錠中

L-システイン …………… 240mg    リポフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>) …………… 6mg  
 アスコルビン酸(ビタミンC) …… 1,000mg    ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>) …… 12mg  
 ビオチン …………… 500μg    コハク酸d-α-トコフェロール  
 ニコチン酸アミド …………… 60mg    (天然型ビタミンE) …… 50mg

添加物として、セルロース、乳糖水和物、カルメロースカルシウム、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタンを含有します。

## ● 用法・用量

成人(15歳以上) …………… 1回2錠    7歳以上15歳未満 …………… 1回1錠  
 7歳未満 …………… 服用しないでください。    1日2回 朝夕に水又はお湯で服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ・用法・用量を厳守してください。
- ・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ● 効能

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着  
 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻血  
 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」  
 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(4) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。また、品質保持の点から、開封後は6ヵ月以内を目安に服用してください。

