

しみ、そばかす、日やけに

服用に際して、この添付文書をよくお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

# ハイティナCプラス

第3類医薬品

— L-システイン 240mg・ビタミンC 1,000mg(成人1日量)、B<sub>2</sub>、B<sub>6</sub>、E 配合 —

本剤配合のL-システイン、ビタミンCが協力して、メラニンの生成をおさえ、肌細胞の代謝を促進します。ビタミンB<sub>2</sub>、B<sub>6</sub>が皮膚、脂質に作用し、ビタミンEと共に肌あれ、しみ、そばかす、にきびなどの症状を緩和、皮膚機能は勿論、歯ぐきからの出血を予防します。



## ⚠ 使用上の注意

### 相談すること

1. 次の場合は、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)服用後、皮膚部に発疹・発赤、かゆみ、消化器に吐き気・嘔吐などの症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、相談してください。
  - (2)1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合。
2. 服用後、下痢症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### ● 成分・分量 6錠(成人1日量) 中

L-システイン ..... 240mg ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>) ..... 12mg  
アスコルビン酸(ビタミンC) ..... 1,000mg コハク酸d-α-トコフェロール  
リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>) ..... 6mg (天然型ビタミンE) ..... 50mg  
添加物として、セルロース、カルメロースカルシウム、トウモロコシデンプン、ケイ酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロビルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタンを含有します。

### ● 用法・用量

成人(15歳以上) ..... 1回2錠 7歳以上15歳未満 ..... 1回1錠  
1日3回 食前または食後に服用してください。  
小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### ● 効能

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着  
次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血  
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」  
次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。

米田 薬品工業株式会社  
製造販売元 奈良県高市郡高取町市尾986



本品について お客様相談室 TEL0744-52-3720  
のお問い合わせ先 月～金曜日 10:00～16:00(祝祭日、特定日を除く)

副作用被害救済制度 TEL0120-149-931 1409C