

鎮咳去痰薬

服用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ゴールドエースせき止め錠

第②類医薬品

「ゴールドエースせき止め錠」は、せき中枢に直接作用するジヒドロコデイン塩酸塩と、アレルギー性のせきに効くクレマスチンフル酸塩がせきを鎮め、dl-メチルエフェドリン塩酸塩が気管支を拡げて呼吸を楽にします。また、L-カルボシスチレンがたんの排出を促し、不快なたんの症状を効果的に改善します。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 12歳未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)。

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがある)。
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5. 過量服用・長期連用しないでください

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難

(6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、肝臓病、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症の診断を受けた人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、興奮、けいれん
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイプルス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。

裏面もお読みください。

肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効能

せき、たん

● 用法・用量

成人(15歳以上) 1回2錠


12歳以上 15歳未満 1回1錠

12歳未満 服用しないでください。

1日3回 食後に服用してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- ・用法・用量を厳守してください。
- ・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。



上図のように、錠剤の入っている
PTPシートの凸部を指先で強く
押して裏面のアルミ箔を破り、取
り出してお飲みください。

● 成分・分量 6錠中

ジヒドロコデインリン酸塩 30mg (せきの中枢に作用して、せきを鎮めます)

dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg (気管支を広げ、呼吸を楽にし、せきを鎮めます)

L-カルボシスチレン 750mg (たんをやわらかくし、吐き出しやすくします)

クレマスチンフル酸塩 1.34mg (抗ヒスタミン剤。アレルギーによるせきを鎮めます)
(クレマスチンとして 1mg)

添加物として、乳糖水和物、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク及び酸化チタンを含有します。

● 保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。

(4) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。また、品質保持の点から、開封後は6ヵ月以内を目安に服用してください。

米田薬品工業株式会社

製造販売元 奈良県高市郡高取町市尾986

本品について お客様相談室 TEL 0120-18-3548
のお問い合わせ先 月～金曜日(祝日を除く) 10:00～16:00

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

2305A