

## ビタミンC錠2000ハイ

第3類医薬品

— 1日量ビタミンC 2000mg 含有 —

ビタミンCは不足すると、疲れや病気に対する抵抗力が低下するなど、体調を維持する為に必須のビタミンです。しかし、ビタミンCは人の体内で作り出す事ができず、医薬品や食品から補給する必要があります。ビタミンC錠2000ハイは、ビタミンCを12錠中に2000mg含有する、黄色い小粒のチュアブル錠です。



## 使用上の注意



## 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ●成分・分量 1日量(12錠)中

アスコルビン酸 ..... 1,000mg アスコルビン酸カルシウム

リボフラビン酪酸エステル ..... 12mg (アスコルビン酸として1,000mg) ..... 1,210mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、エリスリトール、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、グリチルリチン酸二カリウム、香料を含有します。

## ●用法・用量

15歳以上 ..... 1回 4錠 7歳以上15歳未満 ..... 1回 2錠

5歳以上7歳未満 ..... 1回 1錠 5歳未満は服用しないでください。

1日3回 食後、かむか、口中で溶かして服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ●効能

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

## 保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 外箱に表示した使用期限内に服用してください。また、品質保持の点から、開封後は 6ヵ月以内を目安に服用してください。

